

**Kortfattet løsningsforslag til ekstra
prøveeksamen i MAT1100, høsten 2014**

DEL 1

Oppgave 1. (3 poeng) Hvis $f(x, y) = ye^{-xy^2}$, er $\frac{\partial f}{\partial y}$ lik:

- A) $-y^3e^{-xy^2}$
- B) $-2xy^2e^{-xy^2}$
- C) $e^{-xy^2} - ye^{-xy^2}$
- D) $e^{-xy^2} - 2xy^2e^{-xy^2}$
- E) $e^{-xy^2} - xye^{-xy^2}$

Riktig svar: D) $e^{-xy^2} - 2xy^2e^{-xy^2}$

Oppgave 2. (3 poeng) Hvis $f(x, y) = x^2y + y^3$, så er den dobbeltderiverte $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ lik:

- A) $2x$
- B) $2x + 3y^2$
- C) 0
- D) $2xy + 3y^2$
- E) 2

Riktig svar: A) $2x$

Oppgave 3. (3 poeng) Hvis $f(x, y) = \arctan(xy^2)$, så er den retningsderiverte $f'(\mathbf{a}; \mathbf{r})$, der $\mathbf{a} = (1, 1)$ og $\mathbf{r} = (-1, 2)$, lik:

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\frac{7}{2}$
- C) 1
- D) 0
- E) $\frac{5}{2}$

Riktig svar: A) $\frac{3}{2}$

Oppgave 4. (3 poeng) Den rette linjen gjennom punktene $(0, 1, -1, 2)$ og $(1, 1, -1, 3)$ har parametriseringen:

- A) $\mathbf{r}(t) = (t, 1 + t, -1 - t, 2 + 3t)$
- B) $\mathbf{r}(t) = (t, 1 - t, -1 + t, 2 - 3t)$
- C) $\mathbf{r}(t) = (t, 1, -1, 2 + t)$

- D) $\mathbf{r}(t) = (t, 1, -1, 2 + 3t)$
 E) $\mathbf{r}(t) = (1, 1 + t, -1 - t, 3 + 2t)$

Riktig svar: C) $\mathbf{r}(t) = (t, 1, -1, 2 + t)$

Oppgave 5. (3 poeng) Hvis en trekant er utspent av vektorene $(1, 3, -2)$ og $(1, -1, -2)$, så er arealet:

- A) $\frac{5}{2}$
 B) $2\sqrt{3}$
 C) $\frac{7}{2}$
 D) 3
 E) $2\sqrt{5}$

Riktig svar: E) $2\sqrt{5}$

Oppgave 6. (3 poeng) Den deriverte til $f(x) = \arcsin \sqrt{x}$ er lik:

- A) $\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$
 B) $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$
 C) $\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$
 D) $\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$
 E) $-\frac{1}{2\sqrt{x} \sin^2(\sqrt{x})}$

Riktig svar: C) $\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$

Oppgave 7. (3 poeng) Dersom $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ og $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, så er

BA lik:

- A) $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -10 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
 B) $\begin{pmatrix} 7 & 6 & 8 \\ 0 & 11 & 3 \end{pmatrix}$

C) dimensjonene stemmer ikke, så produktet er udefinert.

- D) $\begin{pmatrix} 3 & -10 & 0 \\ 8 & -1 & 7 \end{pmatrix}$
 E) $\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 6 & 11 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$

Riktig svar: E) $\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 6 & 11 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$

Oppgave 8. (3 poeng) Når du skal delbrøkkoppspalte $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^5-1}{(x+1)^2(x^2+2x+2)}$, må du først:

- A) finne konstanter A, B, C slik at $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}$
- B) finne konstanter A, B, C slik at $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}$
- C) polynomdividere
- D) finne konstanter A, B, C, D slik at $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+2x+2}$
- E) finne konstanter A, B, C slik at $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x^2+2x+2}$

Riktig svar: C) polynomdividere

Oppgave 9. (3 poeng) Hvis $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t^2+9}} dt$, så er $f'(2)$ lik:

- A) $\frac{1}{5}$
- B) $\frac{4}{\sqrt{13}}$
- C) $\frac{1}{\sqrt{13}}$
- D) $\frac{4}{3}$
- E) $\frac{4}{5}$

Riktig svar: E) $\frac{4}{5}$

Oppgave 10. (3 poeng) Det uegentlige integralet $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$

- A) divergerer
- B) er lik π
- C) er lik $\ln 8$
- D) er lik $10 \ln 2$
- E) er lik $-\ln(\ln 2)$

Riktig svar: A) divergerer

DEL 2

Oppgave 11. (10 poeng) Finn grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right)$$

der a er et reelt tall.

Løsning:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{a}{x} \right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{a}{x}} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)}{-\frac{1}{x^2}} = a$$

Oppgave 12. (10 poeng) Funksjonen

$$f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$$

er definert for $x \neq 0$. Regn ut gradienten $\nabla f(x, y)$. I hvilken retning vokser funksjonen raskest i punktet $\mathbf{a} = (x, y)$? I hvilke retninger er den retningsderivate lik 0 i dette punktet?

Løsning: Siden

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

og

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

er

$$\nabla f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} (-y, x)$$

Dette betyr at funksjonen vokser raskest i retningen $(-y, x)$ (normalt på stedsvektoren $\mathbf{a} = (x, y)$). Stigningen er null i retninger normalt på gradienten, dvs. i retningene $\pm(x, y)$.

Oppgave 13. (10 poeng) Finn en 2×2 -matrise M slik at

$$M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Løsning: Hvis vi setter $M = \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix}$, får vi ligningene

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ u + v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ u - v \end{pmatrix}$$

Løser vi ligningene $x + y = 4$ og $x - y = 2$, får vi $x = 3, y = 1$, og løser vi ligningene $u + v = 1, u - v = -3$, får vi $u = -1, v = 2$. Dermed er

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Oppgave 14. (10 poeng) Vis at funksjonen $f(x) = x^3 + 2x + 4$ er injektiv og har en omvendt funksjon g . Finn $g'(4)$.

Løsningsforslag: Siden $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ for alle x , er funksjonen strengt voksende og dermed injektiv. Følgelig har den en omvendt funksjon g . Vi ser at $f(0) = 4$, og dermed er

$$g'(4) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

Oppgave 15. (10 poeng) Området under grafen til funksjonen $f(x) = \arctan x$, $0 \leq x \leq 1$, dreies om y -aksen. Finn volumet til omdreiningslegemet.


Løsningsforslag: Ifølge formelen for volumet til et omdreiningslegeme om y -aksen er $V = 2\pi \int_0^1 x \arctan x \, dx$. Bruker vi delvis integrasjon med $u = \arctan x$, $v' = x$, får vi $u' = \frac{1}{1+x^2}$ og $v = \frac{x^2}{2}$. Dermed er

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \arctan x \, dx &= \left[\frac{x^2}{2} \arctan x \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2+1}{1+x^2} \, dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Dette betyr at


$$V = 2\pi \int_0^1 x \arctan x \, dx = \frac{\pi^2}{2} - \pi$$

Oppgave 16. (10 poeng) Figuren viser et trapes innskrevet i en sirkel med radius 1. Grunnlinjen til trapeset er diameter i sirkelen. Hva er det største arealet trapeset kan ha?



Løsningsforslag: Lar vi x være som i figuren nedenfor, blir høyden i trapeset $h = \sqrt{1-x^2}$ og lengden av topplinjen blir $b = 2x$. Siden grunnlinjen er $a = 2$, blir dermed arealet

$$A(x) = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{2+2x}{2} \cdot \sqrt{1-x^2} = (1+x)\sqrt{1-x^2}$$



Derivasjon gir

$$A'(x) = 1 \cdot \sqrt{1-x^2} + (1+x) \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(1-x^2 - (1+x)x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(-2x^2 - x + 1)$$

Løser vi annengradsligningen $2x^2 + x - 1 = 0$, får vi $x = \frac{1}{2}$ og $x = -1$. Den negative løsningen må forkastes, og vi ser (f.eks. ved å bruke fortegnsskjema) at $x = \frac{1}{2}$ gir et maksimumspunkt for funksjonen $A(x)$. Det maksimale arealet er dermed

$$A\left(\frac{1}{2}\right) = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Oppgave 17. (10 poeng) I denne oppgaven er a og b to reelle tall, $a < b$, og $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ er en deriverbar funksjon. Vis at dersom den deriverte f' er begrenset, så er f det også.

Løsningsforslag: Siden f' er begrenset, finnes det et tall M slik at $|f'(x)| \leq M$ for alle $x \in (a, b)$. Velg et punkt d i (a, b) (det mest naturlige valget er kanskje midtpunktet $d = \frac{a+b}{2}$, men det spiller ingen rolle hvilket punkt vi velger). For enhver $x \in (a, b)$, finnes det ifølge middelverdisetningen et punkt c mellom d og x slik at

$$\frac{f(x) - f(d)}{x - d} = f'(c)$$

Dermed er

$$|f(x)| = |f(d) + f'(c)(x - d)| \leq |f(d)| + |f'(c)||x - d| \leq |f(d)| + M(b - a)$$

Dette viser at $|f(d)| + M(b - a)$ er en øvre skranke for $|f|$ på (a, b) , og følgelig er f begrenset.

SLUTT