

INF3170 – Logikk

Forelesning 6: Løse tråder og repetisjon av førsteordens logikk.

Christian Mahesh Hansen

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

26. februar 2007



Dagens plan

- 1 Noen løse tråder
- 2 Førsteordens logikk – repetisjon

Bevisbarhet

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\vdash P \vee \neg P$$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\vdash P, \neg P}{\vdash P \vee \neg P}$$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\frac{P \vdash P}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\begin{array}{c} \times \\ \frac{P \vdash P}{\vdash P, \neg P} \\ \hline \vdash P \vee \neg P \end{array}$$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\begin{array}{c} \times \\ \frac{P \vdash P}{\vdash P, \neg P} \\ \hline \vdash P \vee \neg P \end{array}$$

Notasjon

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar:

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\begin{array}{c} \times \\ \frac{P \vdash P}{\vdash P, \neg P} \\ \hline \vdash P \vee \neg P \end{array}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar: $\vdash \varphi$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar: $\vdash \varphi$ $\vdash_{\text{LK}} \varphi$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar: $\vdash \varphi$ $\vdash_{\text{LK}} \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er (LK-)bevisbar:

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar: $\vdash \varphi$ $\vdash_{\text{LK}} \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er (LK-)bevisbar: $\vdash \Gamma \vdash \Delta$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P}}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar:	$\vdash \varphi$	$\vdash_{\text{LK}} \varphi$
Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er (LK-)bevisbar:	$\vdash \Gamma \vdash \Delta$	$\vdash_{\text{LK}} \Gamma \vdash \Delta$

Bevisbarhet

Definisjon

Et *bevis* for en formel φ er et bevis for sekventen $\vdash \varphi$.

Eksempel

Et bevis for formelen $P \vee \neg P$ er

$$\frac{\begin{array}{c} \times \\ P \vdash P \end{array}}{\vdash P, \neg P} \quad \frac{}{\vdash P \vee \neg P}$$

Notasjon

Formelen φ er (LK-)bevisbar: $\vdash \varphi$ $\quad \vdash_{\text{LK}} \varphi$
 Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er (LK-)bevisbar: $\vdash \Gamma \vdash \Delta$ $\quad \vdash_{\text{LK}} \Gamma \vdash \Delta$

Hva $\vdash \varphi$ betyr må være tydelig i konteksten!

Oppfylbarhet og konsistens

Oppfylbarhet og konsistens

Definisjon

*En mengde Γ av formler er **oppfylbar** hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.*

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar.

Oppfylbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfylbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfylbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Definisjon

En mengde Γ er *konsistent* hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Definisjon

En mengde Γ er *konsistent* hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er konsistent.

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er **oppfyllbar** hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Definisjon

En mengde Γ er **konsistent** hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er konsistent.

$$P \vee Q, \neg P \vdash$$

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Definisjon

En mengde Γ er *konsistent* hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er konsistent.

$$\frac{P \vee Q \vdash P}{P \vee Q, \neg P \vdash}$$

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Definisjon

En mengde Γ er *konsistent* hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er konsistent.

$$\frac{\frac{P \vdash P \quad Q \vdash P}{P \vee Q \vdash P}}{P \vee Q, \neg P \vdash}$$

Oppfyllbarhet og konsistens

Definisjon

En mengde Γ av formler er *oppfyllbar* hvis det fins en modell som oppfyller alle formlene i mengden.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er oppfyllbar. La f.eks. v være en valuasjon som gjør Q sann og P usann.

Definisjon

En mengde Γ er *konsistent* hvis sekventen $\Gamma \vdash$ ikke er bevisbar.

Eksempel

Mengden $\{P \vee Q, \neg P\}$ er konsistent.

$$\begin{array}{c} \times \\ \frac{P \vdash P \quad Q \vdash P}{P \vee Q \vdash P} \\ \frac{\quad}{P \vee Q, \neg P \vdash} \end{array}$$

Oppfylbarhet og konsistens

Sunnhet og kompletthet - andre formuleringer

Sunnhet:

Kompletthet:

Oppfylbarhet og konsistens

Sunnhet og kompletthet - andre formuleringer

Sunnhet: enhver oppfylbar mengde er konsistent.

Kompletthet:

Oppfylbarhet og konsistens

Sunnhet og kompletthet - andre formuleringer

Sunnhet: enhver oppfylbar mengde er konsistent.

Kompletthet: enhver konsistent mengde er oppfylbar.

Oppfylbarhet og konsistens

Sunnhet og kompletthet - andre formuleringer

Sunnhet: enhver oppfylbar mengde er konsistent.

Kompletthet: enhver konsistent mengde er oppfylbar.

Oppgave

Vis at disse formuleringene er ekvivalente med de vanlige formuleringene.

Notasjon

Notasjon

Notasjon

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig:

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig:

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$

Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Hvis Γ og Δ er mengder eller multimengder av formler, har vi også følgende.

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$
 Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Hvis Γ og Δ er mengder eller multimengder av formler, har vi også følgende.

- $\Gamma \models \Delta$:

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$
 Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Hvis Γ og Δ er mengder eller multimengder av formler, har vi også følgende.

- $\Gamma \models \Delta$: enhver modell som gjør alle formlene i Γ sanne, gjør også minst en av formlene i Δ sann.

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$
 Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Hvis Γ og Δ er mengder eller multimengder av formler, har vi også følgende.

- $\Gamma \models \Delta$: enhver modell som gjør alle formlene i Γ sanne, gjør også minst en av formlene i Δ sann.
- $\Gamma \models \varphi$:

Notasjon

Notasjon

Formelen φ er gyldig: $\models \varphi$
 Sekventen $\Gamma \vdash \Delta$ er gyldig: $\models \Gamma \vdash \Delta$

Notasjon

Hvis Γ og Δ er mengder eller multimengder av formler, har vi også følgende.

- $\Gamma \models \Delta$: enhver modell som gjør alle formlene i Γ sanne, gjør også minst en av formlene i Δ sann.
- $\Gamma \models \varphi$: enhver modell som gjør alle formlene i Γ sanne, gjør også φ sann.

Bevisteknikker

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.
 - Anta for motsigelse at påstanden ikke holder, dvs. at $\boxed{1}$ og ikke $\boxed{2}$.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.
 - Anta for motsigelse at påstanden ikke holder, dvs. at $\boxed{1}$ og ikke $\boxed{2}$.
 - Vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.
 - Anta for motsigelse at påstanden ikke holder, dvs. at $\boxed{1}$ og ikke $\boxed{2}$.
 - Vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
 - Konkluder med at påstanden må holde.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.
 - Anta for motsigelse at påstanden ikke holder, dvs. at $\boxed{1}$ og ikke $\boxed{2}$.
 - Vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
 - Konkluder med at påstanden må holde.
- 3 Et bevis for den kontrapositive påstanden: hvis ikke $\boxed{2}$, så ikke $\boxed{1}$.

Bevisteknikker

- Siden noe av det viktigste vi gjør i dette kurset er å bevise påstander, kan det være greit å si noe om hvordan vi gjør det.

Oppgave

Vis at hvis $\boxed{1}$, så $\boxed{2}$.

- 1 Et direkte bevis. Forsøk alltid dette først.
 - Anta $\boxed{1}$ og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til $\boxed{2}$.
- 2 Et motsigelsesbevis. Hvis et direkte bevis ikke er mulig.
 - Anta for motsigelse at påstanden ikke holder, dvs. at $\boxed{1}$ og ikke $\boxed{2}$.
 - Vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
 - Konkluder med at påstanden må holde.
- 3 Et bevis for den kontrapositive påstanden: hvis ikke $\boxed{2}$, så ikke $\boxed{1}$.
 - Dette er essensielt det samme som et motsigelsesbevis.

Bevisteknikker

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.
- Er mer konstruktivt.

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.
- Er mer konstruktivt.
- Kan gi mer intuisjon om grunnene for at noe holder.

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.
- Er mer konstruktivt.
- Kan gi mer intuisjon om grunnene for at noe holder.

Noen fordeler med motsigelsesbevis:

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.
- Er mer konstruktivt.
- Kan gi mer intuisjon om grunnene for at noe holder.

Noen fordeler med motsigelsesbevis:

- Kan være enklere å gjennomføre.

Bevisteknikker

Noen fordeler med direkte bevis:

- Er som regel enklere å lese.
- Kan inneholde mer informasjon.
- Er mer konstruktivt.
- Kan gi mer intuisjon om grunnene for at noe holder.

Noen fordeler med motsigelsesbevis:

- Kan være enklere å gjennomføre.
- Kan være kortere enn direkte bevis.

Bevisteknikker

Bevisteknikker

Oppgave

Vis at ikke \boxed{X} .

Bevisteknikker

Oppgave

Vis at ikke \boxed{X} .

- Anta \boxed{X} og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.

Bevisteknikker

Oppgave

Vis at ikke \boxed{X} .

- Anta \boxed{X} og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
- Dette er **ikke** et motsigelsesbevis, men et **direkte** bevis.

Bevisteknikker

Oppgave

Vis at ikke \boxed{X} .

- Anta \boxed{X} og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
- Dette er **ikke** et motsigelsesbevis, men et **direkte** bevis.

$$\begin{array}{c} \neg A \\ \vdots \\ \frac{\perp}{A} \end{array}$$

Bevisteknikker

Oppgave

Vis at ikke \boxed{X} .

- Anta \boxed{X} og vis klart og tydelig hvorfor denne antakelsen fører til en motsigelse.
- Dette er **ikke** et motsigelsesbevis, men et **direkte** bevis.

$$\frac{\neg A \quad \vdots}{A} \perp$$

$$\frac{A \quad \vdots}{\neg A} \perp$$

1 Noen løse tråder

2 Førsteordens logikk – repetisjon

- Motivasjon
- Førsteordens syntaks og semantikk
- Oppfylbarhet
- Bruke språket til å beskrive modeller

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”
- “2 pluss 2 er lik 4”

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”
- “2 pluss 2 er lik 4”
- “2 ganger 4 er lik 8”

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”
- “2 pluss 2 er lik 4”
- “2 ganger 4 er lik 8”
- “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”
- “2 pluss 2 er lik 4”
- “2 ganger 4 er lik 8”
- “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”
- “hvis n er et partall, så finnes k slik at n er lik k ganger 2”

Oppgave: bruk logikk til å uttrykke *sanne* utsagn om tall

- “2 er et partall”
- “2 pluss 2 er lik 4”
- “2 ganger 4 er lik 8”
- “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”
- “hvis n er et partall, så finnes k slik at n er lik k ganger 2”
- Hva slags logisk språk skal vi bruke?

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:
 - Q_1 står for “0 pluss 0 er lik 0”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:
 - Q_1 står for “0 pluss 0 er lik 0”
 - Q_2 står for “0 pluss 1 er lik 1”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:
 - Q_1 står for “0 pluss 0 er lik 0”
 - Q_2 står for “0 pluss 1 er lik 1”
 - ...

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:
 - Q_1 står for “0 pluss 0 er lik 0”
 - Q_2 står for “0 pluss 1 er lik 1”
 - ...
- Tilsvarende for uttrykk av typen “ n ganger k er lik l ”.

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Uttrykk av typen “ n er et partall”:
 - P_2 står for “2 er et partall”
 - P_4 står for “4 er et partall”
 - ...
- Uttrykk av typen “ n pluss k er lik l ”:
 - Q_1 står for “0 pluss 0 er lik 0”
 - Q_2 står for “0 pluss 1 er lik 1”
 - ...
- Tilsvarende for uttrykk av typen “ n ganger k er lik l ”.
- Mulig, siden vi har uendelig mange utsagnsvariable.

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...
- For $n = 2$ og $k = 4$ får vi $(P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2$

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...
- For $n = 2$ og $k = 4$ får vi $(P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2$
- For $n = 2$ og $k = 6$ får vi $(P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3$

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...
- For $n = 2$ og $k = 4$ får vi $(P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2$
- For $n = 2$ og $k = 6$ får vi $(P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3$
- Vi får en uendelig konjunksjon:

$$((P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2) \wedge ((P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3) \wedge \dots$$

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...
- For $n = 2$ og $k = 4$ får vi $(P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2$
- For $n = 2$ og $k = 6$ får vi $(P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3$
- Vi får en uendelig konjunksjon:

$$((P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2) \wedge ((P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3) \wedge \dots$$

- **Umulig!** Utsagnslogiske formler er **endelige**...

Forsøk 1: utsagnslogikk

- Hva med “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”?
- Vi kan lage atomære utsagn av typen
 - R_1 står for “2 pluss 2 er et partall”
 - R_2 står for “2 pluss 4 er et partall”
 - R_3 står for “2 pluss 6 er et partall”
 - ...
- For $n = 2$ og $k = 4$ får vi $(P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2$
- For $n = 2$ og $k = 6$ får vi $(P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3$
- Vi får en uendelig konjunksjon:

$$((P_2 \wedge P_4) \rightarrow R_2) \wedge ((P_2 \wedge P_6) \rightarrow R_3) \wedge \dots$$

- **Umulig!** Utsagnslogiske formler er **endelige**...
- Utsagnslogikk er ikke uttrykkskraftig nok til å løse oppgaven!

Forsøk 2: førsteordens logikk

- Vi representerer de naturlige tallene med konstantsymboler: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- Vi representerer de naturlige tallene med konstantsymboler: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$
- Vi representerer “pluss” og “gange” med de binære funksjonssymbolene $\dot{+}$ og $\dot{\times}$.

Forsøk 2: førsteordens logikk

- Vi representerer de naturlige tallene med konstantsymboler: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$
- Vi representerer “pluss” og “gange” med de binære funksjonssymbolene $\dot{+}$ og $\dot{\times}$.
- Vi innfører et unært predikatsymbol Par for partall og et binært predikatsymbol \equiv for likhet.

Forsøk 2: førsteordens logikk

- Vi representerer de naturlige tallene med konstantsymboler: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$
- Vi representerer “pluss” og “gange” med de binære funksjonssymbolene $\dot{+}$ og $\dot{\times}$.
- Vi innfører et unært predikatsymbol Par for partall og et binært predikatsymbol \equiv for likhet.
- Vi bruker *innfiks* notasjon for $\dot{+}$, $\dot{\times}$ og \equiv , dvs. $\bar{2}\dot{+}\bar{2}$, $\bar{2}\dot{\times}\bar{2}$ og $\bar{2}\equiv\bar{2}$ i stedet for $\dot{+}(\bar{2}, \bar{2})$, $\dot{\times}(\bar{2}, \bar{2})$ og $\equiv(\bar{2}, \bar{2})$.

Forsøk 2: førsteordens logikk

- Vi representerer de naturlige tallene med konstantsymboler: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$
- Vi representerer “pluss” og “gange” med de binære funksjonssymbolene $\dot{+}$ og $\dot{\times}$.
- Vi innfører et unært predikatsymbol Par for partall og et binært predikatsymbol \equiv for likhet.
- Vi bruker *innfiks* notasjon for $\dot{+}$, $\dot{\times}$ og \equiv , dvs. $\bar{2}\dot{+}\bar{2}$, $\bar{2}\dot{\times}\bar{2}$ og $\bar{2}\equiv\bar{2}$ i stedet for $\dot{+}(\bar{2}, \bar{2})$, $\dot{\times}(\bar{2}, \bar{2})$ og $\equiv(\bar{2}, \bar{2})$.
- Vi får følgende signatur:

$$\langle \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots; \dot{+}, \dot{\times}; \text{Par}, \equiv \rangle$$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- “2 er et partall”:

$\text{Par}(\bar{2})$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- “2 er et partall”:

$$\text{Par}(\bar{2})$$

- “2 pluss 2 er lik 4”:

$$(\bar{2} + \bar{2}) \equiv \bar{4}$$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- “2 er et partall”:

$$\text{Par}(\bar{2})$$

- “2 pluss 2 er lik 4”:

$$(\bar{2} + \bar{2}) \equiv \bar{4}$$

- “2 ganger 4 er lik 8”:

$$(\bar{2} \times \bar{4}) \equiv \bar{8}$$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- “2 er et partall”:

$$\text{Par}(\bar{2})$$

- “2 pluss 2 er lik 4”:

$$(\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$$

- “2 ganger 4 er lik 8”:

$$(\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$$

- “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”:

$$\forall x \forall y ((\text{Par}(x) \wedge \text{Par}(y)) \rightarrow \text{Par}(x \dot{+} y))$$

Forsøk 2: førsteordens logikk

- “2 er et partall”:

$$\text{Par}(\bar{2})$$

- “2 pluss 2 er lik 4”:

$$(\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$$

- “2 ganger 4 er lik 8”:

$$(\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$$

- “hvis n og k er partall, så er n pluss k et partall”:

$$\forall x \forall y ((\text{Par}(x) \wedge \text{Par}(y)) \rightarrow \text{Par}(x \dot{+} y))$$

- “hvis n er et partall, så finnes k slik at n er lik k ganger 2”:

$$\forall x (\text{Par}(x) \rightarrow \exists y (x \equiv (y \dot{\times} \bar{2})))$$

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:
 - $\dot{+}^{\mathcal{M}}$ er addisjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:
 - $\dot{+}^{\mathcal{M}}$ er addisjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
 - $\dot{\times}^{\mathcal{M}}$ er multiplikasjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:
 - $\dot{+}^{\mathcal{M}}$ er addisjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
 - $\dot{\times}^{\mathcal{M}}$ er multiplikasjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
- Vi tolker relasjonssymbolene som følger:

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:
 - $\dot{+}^{\mathcal{M}}$ er addisjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
 - $\dot{\times}^{\mathcal{M}}$ er multiplikasjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
- Vi tolker relasjonssymbolene som følger:
 - $\text{Par}^{\mathcal{M}}$ er mengden $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ (delmengde av $|\mathcal{M}|$)

En modell for utsagnene om tall

- La oss se på hvordan vi tolker utsagnene om tall.
- Vi lager en modell \mathcal{M} med $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Vi tolker konstantsymbolene som følger:
 - $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
 - $\bar{1}^{\mathcal{M}} = 1$
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - ...
- Vi tolker funksjonssymbolene som følger:
 - $\dot{+}^{\mathcal{M}}$ er addisjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
 - $\dot{\times}^{\mathcal{M}}$ er multiplikasjon (funksjon fra $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$ til $|\mathcal{M}|$)
- Vi tolker relasjonssymbolene som følger:
 - $\text{Par}^{\mathcal{M}}$ er mengden $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ (delmengde av $|\mathcal{M}|$)
 - $\equiv^{\mathcal{M}}$ er mengden $\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \dots\}$ (delmengde av $|\mathcal{M}| \times |\mathcal{M}|$)

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$
 - $\langle 4, 4 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$
 - $\langle 4, 4 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$ fordi

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$
 - $\langle 4, 4 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$ og $\bar{8}^{\mathcal{M}} = 8$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$
 - $\langle 4, 4 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$ og $\bar{8}^{\mathcal{M}} = 8$
 - $2 \dot{\times}^{\mathcal{M}} 4 = 2 \cdot 4 = 8$

Modellen oppfyller formlene

- $\mathcal{M} \models \text{Par}(\bar{2})$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$
 - $2 \in \text{Par}^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{+} \bar{2}) \equiv \bar{4}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, og $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$
 - $2 \dot{+}^{\mathcal{M}} 2 = 2 + 2 = 4$
 - $\langle 4, 4 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$
- $\mathcal{M} \models (\bar{2} \dot{\times} \bar{4}) \equiv \bar{8}$ fordi
 - $\bar{2}^{\mathcal{M}} = 2$, $\bar{4}^{\mathcal{M}} = 4$ og $\bar{8}^{\mathcal{M}} = 8$
 - $2 \dot{\times}^{\mathcal{M}} 4 = 2 \cdot 4 = 8$
 - $\langle 8, 8 \rangle \in \equiv^{\mathcal{M}}$

Oppfyllebarhet av ikke-atomære formler

- Hva med ikke-atomære formler?

Oppfyllbarhet av ikke-atomære formler

- Hva med ikke-atomære formler?
- Nye konnektiver i førsteordens logikk er \forall og \exists .

Oppfyllbarhet av ikke-atomære formler

- Hva med ikke-atomære formler?
- Nye konnektiver i førsteordens logikk er \forall og \exists .
- De andre konnektivene tolkes likt som i utsagnslogikk.

Oppfylbarhet av ikke-aromære formler

- Hva med ikke-atomære formler?
- Nye konnektiver i førsteordens logikk er \forall og \exists .
- De andre konnektivene tolkes likt som i utsagnslogikk.
- Vi har definert \models -relasjonen rekursivt, dvs. at vi definerer $\mathcal{M} \models \forall x \varphi$ som en funksjon av $\mathcal{M} \models \varphi$.

Oppfylbarhet av ikke-atomære formler

- Hva med ikke-atomære formler?
- Nye konnektiver i førsteordens logikk er \forall og \exists .
- De andre konnektivene tolkes likt som i utsagnslogikk.
- Vi har definert \models -relasjonen rekursivt, dvs. at vi definerer $\mathcal{M} \models \forall x \varphi$ som en funksjon av $\mathcal{M} \models \varphi$.
- Den bundne variabel x i $\forall x \varphi$ og $\exists x \varphi$ skal løpe over elementene i domenet til \mathcal{M} .

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formel!

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formel!
- Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$...

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formell!
- Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$...
- Vi bruker spesielle *konstantsymboler* for å representere elementene i $|\mathcal{M}|$.

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formell!
- Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$...
- Vi bruker spesielle *konstantsymboler* for å representere elementene i $|\mathcal{M}|$.
- I tallspråket vårt har vi allerede $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ for elementene i $|\mathcal{M}|$.

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formell!
- Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$...
- Vi bruker spesielle *konstantsymboler* for å representere elementene i $|\mathcal{M}|$.
- I tallspråket vårt har vi allerede $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ for elementene i $|\mathcal{M}|$.
- Generelt lager vi et **utvidet språk** fra modellen ved å legge til et konstantsymbol \bar{e} for hvert element e i domenet til modellen.

Oppfyllbarhet av ikke-aromære formler

- Intuitivt har vi at \mathcal{M} oppfyller $\forall x\varphi$ hvis \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$ for *alle* elementer e i domenet til \mathcal{M} .
- Problem: $\varphi[e/x]$ er **ikke** en førsteordens formell!
- Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt \mathcal{M} oppfyller $\varphi[e/x]$...
- Vi bruker spesielle *konstantsymboler* for å representere elementene i $|\mathcal{M}|$.
- I tallspråket vårt har vi allerede $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ for elementene i $|\mathcal{M}|$.
- Generelt lager vi et **utvidet språk** fra modellen ved å legge til et konstantsymbol \bar{e} for hvert element e i domenet til modellen.
- Vi krever at modellen skal tolke konstantsymbolet \bar{e} som elementet e i domenet til modellen.

Førsteordens syntaks og semantikk

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

- 1 Logiske symboler

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

- 1 Logiske symboler
 - konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall
- variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

- 1 Logiske symboler
 - konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
 - hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
 - kvantorer: \exists og \forall
 - variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$
- 2 Ikke-logiske symboler:

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

- 1 Logiske symboler
 - konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
 - hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
 - kvantorer: \exists og \forall
 - variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$
- 2 Ikke-logiske symboler:
 - en tellbar mengde konstantsymboler

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall
- variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

2 Ikke-logiske symboler:

- en tellbar mengde konstantsymboler
- en tellbar mengde funksjonssymboler (med aritet)

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall
- variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

2 Ikke-logiske symboler:

- en tellbar mengde konstantsymboler
- en tellbar mengde funksjonssymboler (med aritet)
- en tellbar mengde relasjonssymboler (med aritet)

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall
- variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

2 Ikke-logiske symboler:

- en tellbar mengde konstantsymboler
 - en tellbar mengde funksjonssymboler (med aritet)
 - en tellbar mengde relasjonssymboler (med aritet)
-
- De ikke-logiske symbolene utgjør en **signatur**

Førsteordens syntaks og semantikk

Et førsteordens språk \mathcal{L} består av:

1 Logiske symboler

- konnektiver: \wedge , \vee , \rightarrow og \neg
- hjelpesymboler: '(' og ')' og ','
- kvantorer: \exists og \forall
- variable: $\mathcal{V} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

2 Ikke-logiske symboler:

- en tellbar mengde konstantsymboler
- en tellbar mengde funksjonssymboler (med aritet)
- en tellbar mengde relasjonssymboler (med aritet)

- De ikke-logiske symbolene utgjør en **signatur**

$$\langle \underbrace{c_1, c_2, c_3, \dots}_{\text{konstantsymboler}} ; \underbrace{f_1, f_2, f_3, \dots}_{\text{funksjonssymboler}} ; \underbrace{R_1, R_2, R_3, \dots}_{\text{relasjonssymboler}} \rangle.$$

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

- 1 Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

- 1 Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :
 - Enhver variabel og konstant er en term.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

① Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :

- Enhver variabel og konstant er en term.
- Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

- 1 Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :
 - Enhver variabel og konstant er en term.
 - Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.
- 2 Mengden \mathcal{F} av formler i \mathcal{L} :

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

- 1 Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :
 - Enhver variabel og konstant er en term.
 - Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.
- 2 Mengden \mathcal{F} av formler i \mathcal{L} :
 - Hvis R er et relasjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $R(t_1, \dots, t_n)$ en (atomær) formel.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

- 1 Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :
 - Enhver variabel og konstant er en term.
 - Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.
- 2 Mengden \mathcal{F} av formler i \mathcal{L} :
 - Hvis R er et relasjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $R(t_1, \dots, t_n)$ en (atomær) formel.
 - Hvis φ og ψ er formler, så er $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ og $(\varphi \rightarrow \psi)$ formler.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

① Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :

- Enhver variabel og konstant er en term.
- Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.

② Mengden \mathcal{F} av formler i \mathcal{L} :

- Hvis R er et relasjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $R(t_1, \dots, t_n)$ en (atomær) formel.
- Hvis φ og ψ er formler, så er $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ og $(\varphi \rightarrow \psi)$ formler.
- Hvis φ er en formel og x er en variabel, så er $\forall x\varphi$ og $\exists x\varphi$ formler.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis et førsteordens språk \mathcal{L} er gitt, så får vi (definert induktivt):

① Mengden \mathcal{T} av termer i \mathcal{L} :

- Enhver variabel og konstant er en term.
- Hvis f er et funksjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $f(t_1, \dots, t_n)$ en term.

② Mengden \mathcal{F} av formler i \mathcal{L} :

- Hvis R er et relasjonssymbol med aritet n og t_1, \dots, t_n er termer, så er $R(t_1, \dots, t_n)$ en (atomær) formel.
- Hvis φ og ψ er formler, så er $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$ og $(\varphi \rightarrow \psi)$ formler.
- Hvis φ er en formel og x er en variabel, så er $\forall x\varphi$ og $\exists x\varphi$ formler.

Alle forekomster av en variabel x i φ sies å være bundet i formlene $\forall x\varphi$ og $\exists x\varphi$ og innenfor skopet til den gjeldende kvantoren.

Førsteordens syntaks og semantikk

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **eller** $\mathcal{M} \models \psi$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.

- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **eller** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **impliserer** $\mathcal{M} \models \psi$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.


- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **eller** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **impliserer** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \forall x\varphi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi[\bar{a}/x]$ **for alle** a i $|\mathcal{M}|$.

Førsteordens syntaks og semantikk

Hvis \mathcal{M} er en modell og φ er en lukket formel, så definerte vi $\mathcal{M} \models \varphi$. Vi brukte det utvidete språket - med konstanter for hvert element i domenet - for å gjøre dette.


- For atomære formler: $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ hvis $\langle t_1^{\mathcal{M}}, \dots, t_n^{\mathcal{M}} \rangle \in R^{\mathcal{M}}$.
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ hvis det **ikke** er tilfelle at $\mathcal{M} \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **og** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **eller** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi$ **impliserer** $\mathcal{M} \models \psi$.
- $\mathcal{M} \models \forall x\varphi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi[\bar{a}/x]$ **for alle** a i $|\mathcal{M}|$.
- $\mathcal{M} \models \exists x\varphi$ hvis $\mathcal{M} \models \varphi[\bar{a}/x]$ **for minst en** a i $|\mathcal{M}|$.

Oppfylldbarhet




Oppfylbarhet

- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?




Oppfyllbarhet




- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .
 $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$

Oppfyllbarhet




- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\mathcal{M} \models \text{Liten}(a)$

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$$




det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\mathcal{M} \models \text{Liten}(\bar{a})$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\mathcal{M} \models \text{Liten}(\bar{a})$




det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $a \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$

Oppfylbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\mathcal{M} \models \text{Liten}(\bar{a})$




det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $a \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$

- Siden $\text{Liten}^{\mathcal{M}} = \{\bullet, \blacktriangle\}$, kan vi konkludere med

Oppfylbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \exists x \text{Liten}(x)$$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\mathcal{M} \models \text{Liten}(\bar{a})$




det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$



det fins en $a \in |\mathcal{M}|$ slik at $a \in \text{Liten}^{\mathcal{M}}$


- Siden $\text{Liten}^{\mathcal{M}} = \{\bullet, \blacktriangle\}$, kan vi konkludere med **JA**.

Oppfylbarhet




Oppfyllbarhet

- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?




Oppfyllbarhet




- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .
$$\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$$

Oppfyllbarhet




- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$$

$$\Updownarrow$$

for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a})$

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$$




for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a})$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}$


Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x) \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } \mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } \bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Stor}^{\mathcal{M}} \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}
 \end{aligned}$$

Oppfyllbarhet




- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x) \\
 & \iff \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } \mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \\
 & \iff \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } \bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Stor}^{\mathcal{M}} \\
 & \iff \\
 & \text{for alle } a \in |\mathcal{M}| \text{ så } a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}
 \end{aligned}$$

- Siden $|\mathcal{M}| = \{\blacksquare, \bullet, \blacktriangle\}$ og $\text{Stor}^{\mathcal{M}} = \{\bullet, \blacktriangle\}$, så kan vi konkludere med

Oppfyllbarhet



- Er det slik at $\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$?
- For å svare, må vi se på definisjonen av \models .

$$\mathcal{M} \models \forall x \text{Stor}(x)$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a})$




for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $\bar{a}^{\mathcal{M}} \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}$




for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så $a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}$

- Siden $|\mathcal{M}| = \{\blacksquare, \bullet, \blacktriangle\}$ og $\text{Stor}^{\mathcal{M}} = \{\bullet, \blacktriangle\}$, så kan vi konkludere med **NEI**.

Oppfylbarhet




Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$

Oppfyllbarhet




$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \rightarrow \text{Sirkel}(\bar{a})$$

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \rightarrow \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \text{ impliserer } \mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a})$$

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \rightarrow \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \text{ impliserer } \mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\text{hvis } a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}, \text{ så } a \in \text{Sirkel}^{\mathcal{M}}$$

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \rightarrow \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \text{ impliserer } \mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a})$$




for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\text{hvis } a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}, \text{ så } a \in \text{Sirkel}^{\mathcal{M}}$$



“alle store objekter er sirkler”

Oppfylbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \text{Sirkel}(x))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \rightarrow \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Stor}(\bar{a}) \text{ impliserer } \mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a})$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\text{hvis } a \in \text{Stor}^{\mathcal{M}}, \text{ så } a \in \text{Sirkel}^{\mathcal{M}}$$




“alle store objekter er sirkler”

Påstander holder ikke.

Oppfylldbarhet




Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$

Oppfyllbarhet




$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$




for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$

Oppfyllbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{ Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{ Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \text{ Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\text{fins } b, c \in \mathcal{M} \text{ slik at } \mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$$

Oppfylbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$




for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\text{fins } b, c \in \mathcal{M} \text{ slik at } \mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$$

Påstanden holder, fordi

Oppfylbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$




for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\text{fins } b, c \in \mathcal{M} \text{ slik at } \mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$$

Påstanden holder, fordi

$$\mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{\bullet}, \bar{\blacksquare}, \bar{\bullet}) \text{ og}$$

Oppfylbarhet



$$\mathcal{M} \models \forall x(\text{Sirkel}(x) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(x, y, z))$$



for alle $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \text{Sirkel}(\bar{a}) \rightarrow \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så

$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \text{Mellom}(\bar{a}, y, z)$$



for alle sirkler $a \in |\mathcal{M}|$ så


$$\text{fins } b, c \in \mathcal{M} \text{ slik at } \mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$$

Påstanden holder, fordi

$$\mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{\text{Sirkel}}, \bar{\text{Sirkel}}, \bar{\text{Sirkel}}) \text{ og}$$


$$\mathcal{M} \models \text{Mellom}(\bar{\text{Sirkel}}, \bar{\text{Sirkel}}, \bar{\text{Triangel}}).$$

Oppfylbarhet




Oppfyllbarhet

Er følgende formel oppfyllbare samtidig?




Oppfyllbarhet



Er følgende formel oppfyllbare samtidig?

① $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

① $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllebare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- 3 $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- 3 $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- 3 $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 4 $\neg \exists x(\text{VenstreFor}(x, a) \vee \text{HoyreFor}(x, a))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- ① $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- ② $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- ③ $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- ④ $\neg \exists x(\text{VenstreFor}(x, a) \vee \text{HoyreFor}(x, a))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- 3 $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 4 $\neg \exists x(\text{VenstreFor}(x, a) \vee \text{HoyreFor}(x, a))$
- 5 $\forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \exists y \text{Over}(y, x))$


Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- 1 $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- 2 $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- 3 $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 4 $\neg \exists x(\text{VenstreFor}(x, a) \vee \text{HoyreFor}(x, a))$
- 5 $\forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \exists y \text{Over}(y, x))$

Oppfyllbarhet




Er følgende formler oppfyllbare samtidig?

- ① $\text{Stor}(a) \wedge \text{Liten}(b)$
- ② $\forall x(\text{Trekant}(x))$
- ③ $\forall x(\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- ④ $\neg \exists x(\text{VenstreFor}(x, a) \vee \text{HoyreFor}(x, a))$
- ⑤ $\forall x(\text{Stor}(x) \rightarrow \exists y \text{Over}(y, x))$


Svaret er JA!

Oppfylbarhet




Oppfyllbarhet

Er følgende formel oppfyllbar?




Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare?

① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Oppfyllbarhet




Er følgende formler oppfyllbare?

① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Svaret er JA!

Oppfyllbarhet




Er følgende formler oppfyllbare?

① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Svaret er JA!

Oppfyllbarhet




Er følgende formler oppfyllbare?

① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Svaret er JA!

Oppfyllbarhet




Er følgende formler oppfyllbare?

$$\textcircled{1} \neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$$

Svaret er JA!

$$\text{La } |\mathcal{M}| = \{\text{pentagon}\} \text{ og } a^{\mathcal{M}} = \text{pentagon}.$$

Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare?


- ① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Svaret er JA!

La $|\mathcal{M}| = \{\text{pentagon}\}$ og $a^{\mathcal{M}} = \text{pentagon}$.

- ② $\text{Liten}(a) \wedge \text{Stor}(a)$

Oppfyllbarhet



Er følgende formler oppfyllbare?

- ① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$


Svaret er JA!

La $|\mathcal{M}| = \{\text{pentagon}\}$ og $a^{\mathcal{M}} = \text{pentagon}$.

- ② $\text{Liten}(a) \wedge \text{Stor}(a)$

Svaret er JA!

Oppfyllbarhet



Er følgende formel oppfyllbar?

- ① $\neg \text{Sirkel}(a) \wedge \neg \text{Trekant}(a) \wedge \neg \text{Firkant}(a)$

Svaret er JA!


La $|\mathcal{M}| = \{\text{pentagon}\}$ og $a^{\mathcal{M}} = \text{pentagon}$.

- ② $\text{Liten}(a) \wedge \text{Stor}(a)$

Svaret er JA!


La $|\mathcal{M}| = \{\text{bicycle}\}$, $a^{\mathcal{M}} = \text{bicycle}$ og
 $\text{Liten}^{\mathcal{M}} = \text{Stor}^{\mathcal{M}} = \{\text{bicycle}\}$

Bruke språket til å beskrive modeller



Bruke språket til å beskrive modeller


Gi en mengde formuler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.




Bruke språket til å beskrive modeller

Gi en mengde formler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$




Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$


Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$
- 3 $\text{VenstreFor}(a, b)$


Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$
- 3 $\text{VenstreFor}(a, b)$
- 4 $\forall x (\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$


Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$
- 3 $\text{VenstreFor}(a, b)$
- 4 $\forall x (\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 5 $\forall x (\neg \text{Over}(x, a) \wedge \neg \text{Under}(x, a))$


Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formuler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$
- 3 $\text{VenstreFor}(a, b)$
- 4 $\forall x (\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 5 $\forall x (\neg \text{Over}(x, a) \wedge \neg \text{Under}(x, a))$
- 6 $\forall x (\neg \text{VenstreFor}(x, a) \wedge \neg \text{HoyreFor}(x, b))$

Bruke språket til å beskrive modeller



Gi en mengde formuler som beskriver denne modellen nøyaktig, dvs. som har denne og (essensielt) ingen andre modeller.

- 1 $\text{Sirkel}(a) \wedge \text{Firkant}(b)$
- 2 $\forall x \text{Liten}(x)$
- 3 $\text{VenstreFor}(a, b)$
- 4 $\forall x (\text{Inntil}(x, a) \vee \text{Inntil}(x, b))$
- 5 $\forall x (\neg \text{Over}(x, a) \wedge \neg \text{Under}(x, a))$
- 6 $\forall x (\neg \text{VenstreFor}(x, a) \wedge \neg \text{HoyreFor}(x, b))$

Ganske vanskelig...

