
Mer om Fourier-rekker

Def En funksjon $f : [c,d] \to \mathbb{R}$ kalles stykkevis kontinuerlig deriverbar hvis det finnes en partisjon

$$c = c_0 < c_1 < c_2 < \cdots < c_k = d$$

og for hver $i = 1, \cdots, k$ en kontinuerlig deriverbar funksjon f_i på $[c_{i-1}, c_i)$ slik at $f = f_i$ på (c_{i-1}, c_i).

Eks:



Teorem La $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vær en 2π-periodisk funksjon som er stykkevis kontinuerlig deriverbar på intervallet $[-\pi, \pi]$. Hvis f har Fourier-koeffisientene a_n, b_n, så gjelder


$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \right)$$

for alla punkter x där f är kontinuerlig.

Bevis: Utelatt.

Ex: Låt f vara den 2π-periodiska funktionen med

$$f(x) = |x| \quad \text{för} \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$



Siden f er en jevn funksjon, er $b_n = 0$ for alle n. Videre er

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cdot \cos(nx)\, dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} x \cdot \cos(nx)\, dx$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} x\, dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi$$

For $n \geq 1$:

$$\frac{\pi}{2} \cdot a_n = \int_{0}^{\pi} x \cdot \cos(nx)\, dx$$

$$= \frac{x}{n} \sin(nx) \Big|_{x=0}^{x=\pi} - \int_{0}^{\pi} \frac{1}{n} \sin(nx)\, dx$$

$$= 0 + \frac{1}{n^2}\cos(nx)\Big|_{x=0}^{x=\pi}$$

$$= \frac{1}{n^2}\left((-1)^n - 1\right)$$

$$= \begin{cases} 0, & n \text{ jevn} \\ -\frac{2}{n^2}, & n \text{ odde.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ jevn} \\ -\frac{4}{n^2\pi}, & n \text{ odde.} \end{cases}$$

Siden f er kontinuerlig på hele $\mathbb{R}$ og stykkevis kontin. deriverbar på $[-\pi, \pi)$, er

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos\left((2k-1)x\right)}{(2k-1)^2}$$


för alla $x \in \mathbb{R}$. För $x = 0$ får vi

$$0 = f(0) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots$$

Ex: La f vara den 2π-periodiska funktionen med

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \underbrace{\cos(0 \cdot x)}_{1} \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} 1 \, dx = 1.$$

For $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} \cos(nx)$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi}$$

$$= 0.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx)\, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx)\, dx$$

$$= -\frac{1}{\pi n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi}$$

$$= -\frac{1}{\pi n} \left((-1)^n - 1 \right)$$

$$= \begin{cases} 0, & n \text{ jevn} \\ \frac{2}{\pi n}, & n \text{ odd}. \end{cases}$$

Siden $f|_{[-\pi,\pi)}$ er stykkevis kontinuerlig deriverbar, er

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

for alle reelle tall x som ikke er på formen $x = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$.

Spesielt er for $x = \frac{\pi}{2}$:

$$1 = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin\left(k\pi - \frac{\pi}{2}\right)}{2k-1}$$

Siden $\sin\left(k\pi - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(k\pi)$


$$= (-1)^{k+1},$$

er

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

7.1 Symmetrigrupper

Eks: Symmetrigruppa til en likesidet trekant T.



$A = (1, 0)$

$B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$C = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ρ = rotasjonen om origo med vinkel $\frac{2\pi}{3}$

Matrisen til $\rho = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Orienteringsbevarende symmetrier av T:

$$Id, \rho, \rho^2.$$

μ = speiling om x-aksen

Matrisen til $\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Hvis $m: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ er en

mittpunktsnormalen symmetri
av $\bar{T}$, så är $m\mu$ mittpunkts-
linjerande, så

$$m\mu = \rho^i, \quad i \in \{0, 1, 2\}.$$

$$\Rightarrow m = \rho^i \mu$$

De mittpunktsnormalen
symmetrierna till $\bar{T}$ är därför

$$\mu, \rho\mu, \rho^2\mu.$$

Tillsammans:

$$Sym(\bar{T}) = \{\bar{Id}, \rho, \rho^2, \mu, \rho\mu, \rho^2\mu\}$$

som mengde.

$\mu\rho = ?$

Vi vet at $\mu\rho = \rho^i\mu$

for en $i \in \{0, 1, 2\}$. Da er

$$\mu\rho\mu = \rho^i$$

Vi bestemmer i:

$$\mu\rho\mu(A) = \mu\rho(A)$$

$$= \mu(B) = C$$

$$= \rho^2(A)$$

Siden $\mu\rho\mu$ og ρ^2 begge er minimeringsbrannde, må

$$\mu\rho\mu = \rho^2$$

$$\Rightarrow \quad \mu\rho = \rho^2\mu .$$

Dermed er multiplikasjonen i $\mathrm{Sym}(\bar{T})$ fullstendig bestemt:

$$\mathrm{Sym}(\bar{T}) =$$

$$\langle \underbrace{\rho, \mu}_{\text{generatorer}} \mid \rho^3 = \mu^2 = \bar{Id}, \underbrace{\mu\rho = \rho^2\mu}_{\text{relasjoner}} \rangle$$

$\cong$ den symmetriske gruppa S_3.

Eksempel på bruk av relasjonene:

$$\mu^3\rho^2\mu\rho^4 = \mu\rho^2\mu\rho = \mu\rho\cdot\rho^2\mu$$

$$= \mu\rho\mu = \rho^2\mu\cdot\mu = \rho^2.$$