Repetisjon

Idag: Funksjoner av én variabel: kap 2.1 – 2.2
kap 3

Mulige eksamensoppgaver:

Kurvediskusjon
Oppstilte max/min-problemer
Grenseoppgaven: L'Hôp.tal
Integrasjon — skalfri av variabel
— delvis integrasjon

Hovedtrolle innehaverne:

Funksjoner:

Potensfunksjoner: $f(x) = x^n$, $f'(x) = nx^{n-1}$

Eksponentialfunksjoner: $f(x) = e^x$, $f'(x) = e^x$

$e^x \cdot e^y = e^{x+y}$, $(e^x)^y = e^{xy}$, $e^0 = 1$

Logaritmefunksjoner: $f(x) = \ln|x|$, $f'(x) = \frac{1}{x}$

$\ln(xy) = \ln x + \ln y$ $\ln(\frac{x}{y}) = \ln x - \ln y$

$\ln(\frac{1}{y}) = -\ln x$, $\ln(x^a) = a \ln x$, $x > 0$.

$\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$.

Trigonometriske funksjoner:

$f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x$

$f(x) = \cos x$, $f'(x) = -\sin x$

$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$

$f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Eksaktverdier på formelark.

Trigonometriske identiteter:

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

Deriveringsregler

$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$

$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$(af(x))' = af'(x)$ a konstant

$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$

$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$ kjerneregelen.

Funksjonsdrøfting

Skal undersøke funksjonen f.

Hvor er f positiv og negativ? $f>0$, $f<0$

Hvor er f voksende og avtagende? $f'>0$, $f'<0$

Hvor mange f oppover og hvor vokser? $f''>0$, $f''<0$

konvekskr — skjær i punkter — kvadrat

Maks. og min. punkter: Endepunkter og der den deriverte bytter fortegn

Vendepunkter: Punkter der funksjonen skifter krumning


Eksempel: Drøft $f(x)=x^2e^x$ på intervallet $[-5,1]$

1 Hvor er den pos. og hvor negativ: $f(x)>0$ for alle x unntatt 0.
$f(0)=0$.

2 Hvor vokser og hvor avtar $f(x)$?

$$f'(x)=2xe^x+x^2e^x=(x^2+2x)e^x=x(x+2)e^x$$

Drøfter fortegnet til $f'(x)$



Konklusjon: f vokser i intervallene $[-5,-2]$ og $[0,1]$
f avtar i intervallet $[-2,0]$

3. Finn maks. og min. til f:

Kritiske punkter: Endepunktene $-5,-1$
Stasjonære punkter $0,-2$

Mulige makspunkter: $x=-2$, $x=1$
Mulig min punkter: $x=0$, $x=-5$

↓
minimum - enste punkt $f(x)$ ikke er strengt positiv.

Sammenligner potensielle maks punkter:

$f(-2)=(-2)^2e^{-2}=\frac{4}{e^2}<1$

$f(1)=1^2\cdot e^1=e\times 2{,}71828\,1828>1$

1 er maksimumspunkt, maksverdien er e.

4: Hvor krummer $f(x)$ opp og hvor krummer den nedover?

$$f''(x)=\left((x^2+2x)e^x\right)'=(2x+2)e^x+(x^2+2x)e^x$$
$$=e^x\left(x^2+4x+2\right)$$

Faktoriserer (x^2+4x+2): Løser $x^2+4x+2=0$:


$$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\cdot1\cdot2}}{2}=\frac{-4\pm\sqrt{8}}{2}$$

$\sqrt{8}=\sqrt{4\cdot2}=\sqrt{4}\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

$$=\frac{-4\pm2\sqrt{2}}{2}=-2\pm\sqrt{2}=\begin{cases}-2+\sqrt{2}\approx-0.6\\-2-\sqrt{2}\approx-3.4\end{cases}$$

$$f''(x)=e^x\left(x-(-2-\sqrt{2})\right)\left(x-(-2+\sqrt{2})\right)$$


Drøfter fortegn



f er konveks i $[-5,-2-\sqrt{2}]$ og $[-2+\sqrt{2},1]$


konkav i $[-2-\sqrt{2},-2+\sqrt{2}]$.

Tegner grafen:




Uoppstilte maks/min-problemer

Eksempel: Blikkplate




vipper opp

vipper opp



Hva er arealet utbrettet når x?





$$A(x) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\sin x + 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cos x\cdot\frac{1}{3}\sin x$$

$$= \frac{1}{9}\underbrace{(\sin x + \cos x \sin x)}_{f(x)}$$ maa maksimeres.

$$f'(x) = \cos x + (-\sin x)\sin x + \cos x \cos x$$

$$= \cos x - \sin^2 x + \cos^2 x$$

$$= \cos x - (1-\cos^2 x) + \cos^2 x$$

$$= 2\cos^2 x + \cos x - 1$$

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

Må løse $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ $\quad u = \cos x$

$$2u^2 + u - 1 = 0$$

Løser denne ↑

$$u = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4\cdot 2\,(-1)}}{2\cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} = \begin{cases} \frac{1}{2} \\ -1 \end{cases}$$

To løsninger $\cos x = \frac{1}{2}$, $\cos x = -1$

$x = \frac{\pi}{3}$ (lik 60°). $x = \pi$ glemmer.

Gränsvärden

L'Hôpitals regel: Anta att enten

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$$

eller

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \infty$$

og at

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{eksisterer (og er lik } \pm\infty\text{)},$$

så er

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Eksempel: $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{1} = \frac{1}{1} = 1$

Eksempel: $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{2x} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-\cos x}{2} = \frac{-1}{2}$

(0, $-\infty$)

Eksempel: $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$ ($\ln x \to -\infty$, $\frac{1}{x} \to \infty$)

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \cdot x^2 = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{-1} = 0$$

Eksempel: $\lim_{x\to 0^+} \left(\ln(x) + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x \ln x + 1}{x}$ ($\ln(x) \to -\infty$, $\frac{1}{x} \to \infty$; $x \ln x + 1 \to 1$, $x \to 0$)

Andre varianter: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^4 + 2x^3 - 1}{1 + 3x^2 + 7x^4} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^4 \left[1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^4}\right]}{x^4 \left[\frac{1}{x^4} + \frac{3}{x^2} + 7\right]}$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^4}}{\frac{1}{x^4} + \frac{3}{x^2} + 7} = \frac{1}{7}$$

$$\lim \frac{1 \cdot 2^n - 3 \cdot 1 \cdot 1^n}{4 \cdot 1 \cdot 2^n - 4 \cdot 0 \cdot 9^n} = \lim \frac{1 \cdot 2^n \left(1 - 2 \cdot \frac{1 \cdot 1^n}{1 \cdot 2^n}\right)}{1 \cdot 2^n \left(4 - \frac{0 \cdot 9^n}{1 \cdot 2^n}\right)} = \frac{1}{4}$$

($\frac{1 \cdot 1^n}{1 \cdot 2^n} \to 0$, $\frac{0 \cdot 9^n}{1 \cdot 2^n} \to 0$)

$$\frac{1 \cdot 1^n}{1 \cdot 2^n} = \left(\frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 2}\right)^n \to 0$$

($\frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 2} < 1$)