

# Befolkning og velferd ECON 1730, H2018

## Regresjonsanalyse


Problem: Gitt planer for 60 nye boliger i kommunen neste år, hvor mange innflyttere kan vi forvente?

Tabell

Spredningsdiagram

Vestby kommune

	Nye boliger	Netto innfl.
1984	56	104
1985	56	235
1986	59	211
1987	42	-61
1988	51	22
1989	28	-123
1990	27	-147
1991	75	-8
1992	36	-107
1993	38	-34
1994	20	9
1995	46	1
1996	24	14
1997	17	61
1998	16	25



I spredningsdiagrammet ser vi en svak sammenheng mellom boligbygging og innflytting: det er en tendens til at år med forholdsvis mange nye boliger (dvs. flere enn gjennomsnittet – den lodrette stiplede linjen) også har forholdsvis mye innflytting (over gjennomsnittet – den vannrette stiplede linjen). Også omvendt: år med få nye boliger har en tendens til å ha lav innflytting – til og med utflytting!

Men: hvor mye netto innflytting gir 60 nye boliger? Eller generelt et visst antall X nye boliger?

Regresjonsanalyse er en teknikk som finner en sammenheng mellom en variabel X og en variabel Y når vi antar at X påvirker Y:  $X \rightarrow Y$ .

Den enkleste forutsetningen for en slik sammenheng er at X og Y henger lineært sammen. Dette blir en rett linje i spredningsdiagrammet.

Algebraisk:  $Y = a + b \cdot X$ , eller netto innflytting =  $a + b \cdot$ boliger.


Variabelen X (her boligbygging) kalles for den uavhengige variabelen, variabel Y (netto innflytting) er den avhengige variabelen.

Når vi antar en slik lineær sammenheng kaller vi metoden for lineær regresjon.

Størrelsene  $a$  og  $b$  kalles for parametrene. De bestemmer hvordan den lineære sammenhengen ser ut.

$a$ : netto innflytting når ingen boliger bygges ( $X = 0$ ). Kan være negativ!

$b$ : ekstra innflytting når 1 ekstra bolig bygges.



$a$  kalles også for skjæringspunkt eller konstant,  $b$  for stigningstall eller koeffisient.

Gitt en rekke tall med observerte verdier for  $X$  og  $Y$  (f.eks. som i tabellen) finnes det statistiske metoder som beregner ("estimerer") optimale verdier for  $a$  og  $b$ .

Hvordan er ikke pensum (jf. "minstekvadratersmetode" i håndbøker).

Men viktig er tolkningen av resultatene.

I dette tilfellet regnet regresjonsfunksjon i Excel ut følgende resultater for Vestby:


$a = -85,1$  og  $b = 2,5$ .

slik at sammenhengen blir: netto innflytting =  $-85,1 + 2,5 \cdot \text{boliger}$ .

Tolkning: uten boligbygging (dvs.  $X = 0$ ) blir det en netto utflytting på 85 personer (avrundet); 1 ekstra bolig medfører i snitt 2,5 personer ekstra som flytter inn i kommunen. 60 nye boliger ville medføre en netto innflytting som er lik  $(-85,1 + 2,5 \cdot 60) = 65$  personer (avrundet).

Spørsmål: var verdien 2,5 et rimelig estimat for  $b$ ?


Et annet eksempel



Kilde: Huber et al. 2009. Forkortelse land: IC (Island), DK (Danmark), NL (Nederland), NO (Norge), FI (Finland), SU (Sveits), SW (Sverige), AU (Østerrike), (UK) Storbritannia, (CZ) Tsjekkia, (GE) Tyskland, (FR) Frankrike, (ES) Spania, (US) USA, (IT) Italia, (HU) Ungarn, (PO) Polen.

**Figur 10.2. Tilgang til pleie- og omsorgstjenester etter land (andel 65år + med hjemmetjenester og institusjonstjenester)**

Fra Daatlands pensumartikkel «Komparative perspektiver på omsorgstjenestene – Norge i en internasjonal sammenheng»



### Statistisk usikkerhet

Mange av de observerte datapunkter ligger på stor avstand fra den estimerte linjen. Sagt på en annen måte: den estimerte sammenhengen (rett linje; netto innflytting =  $-85,1 + 2,5 \cdot \text{boliger}$ ) er langt fra perfekt, sammenlignet med de observerte tallene. Det må ha vært andre faktorer enn boligbygging som har påvirket innflytting, for eksempel arbeidsmarkedsforhold i Vestby eller i fraflyttingskommunene.

Linjen representerer en tenkt sammenheng, m.a.o. en modell. Avvikene er modellfeil. Modellfeilene gjør at estimatene for  $a$  og  $b$  er usikre. Med litt andre observerte verdier ville også  $a$  og  $b$  fått andre estimerte verdier. Med andre ord: de estimerte verdiene for  $a$  og  $b$  (skrives som hhv  $\hat{a}$  og  $\hat{b}$ ) har en statistisk fordeling. Hvis vi antar en viss fordeling for modellfeilene, kan vi regne ut fordelingen til estimatene  $\hat{a}$  og  $\hat{b}$ . Det er vanlig å anta at modellfeilene er normalfordelte ("klokkekurve") med forventning ("gjennomsnitt") lik null.

Med denne forutsetningen har estimatene  $\hat{a}$  og  $\hat{b}$  en bestemt fordeling (NB ikke nødvendigvis en normalfordeling!), med en bestemt forventning/gjennomsnitt og et bestemt standardavvik.

Forventningen til  $\hat{b}$  er lik den ukjente verdien  $b$ . Standardavviket kan beregnes (bl.a. i Excel). Dette standardavviket kalles for estimatets standardfeil.

Stor standardfeil medfører at sjansen er stor for at estimatet  $\hat{b}$  blir nokså forskjellig fra den virkelige (men ukjente) verdien for  $b$ .

Standardfeilen til  $\hat{b}$  må sees i sammenheng med selve  $\hat{b}$ -verdien. En stor standardfeil er mindre alvorlig når  $\hat{b}$  er stor, sammenlignet med en liten  $\hat{b}$ . Det samme gjelder estimatet  $\hat{a}$ , men det er særlig viktig for  $\hat{b}$ : hvis vi ikke kan stole på verdien til  $\hat{b}$ , vet vi ikke om den sanne  $b$ 'en er positiv, negativ, eller kanskje null (ingen lineær sammenheng mellom X og Y!).

Sannsynligheten på at den virkelige  $b$  har motsatt fortegn, øker når standardfeilen til  $\hat{b}$  øker i forhold til  $\hat{b}$ . Derfor er det vanlig å se på brøken  $\frac{\hat{b}}{\text{standardfeil for } \hat{b}}$ .

Denne brøken kalles for t-verdien til  $\hat{b}$ , og Excel regner den ut sammen med  $\hat{b}$ .

Tommelfingerregel: når  $t$  er større enn  $+2$ , eller mindre enn  $-2$ , er det bare maks.  $2\frac{1}{2}\%$  sannsynlig at den virkelige  $b$  har motsatt fortegn sammenlignet med  $\hat{b}$ . Det er akseptabelt.

I vårt eksempel er t-verdien for  $\hat{b}$  lik 1,60. Det betyr at sannsynligheten for en negativ verdi for  $b$  er større enn  $2\frac{1}{2}\%$ . (Den er faktisk rundt 6-7 prosent.)

## R<sup>2</sup>

En viktig størrelse som brukes for å karakterisere hvor godt modellen passer til dataene er  $R^2$  ("coefficient of determination"). Den forteller oss hvor mye usikkerheten er blitt redusert etter at vi estimerte modellen.  $R^2$  ligger mellom 0 og 1.

- $R^2 = 1$ : perfekt lineær sammenheng mellom X og Y. Alle observerte datapunkter ligger på regresjonslinjen  $Y = \hat{a} + \hat{b} * X$ .
- $R^2 = 0$ : ingen lineær sammenheng mellom X og Y.

Når den estimerte helningen  $\hat{b}$  er positiv, er R, d.v.s. kvadratroten av  $R^2$  også positiv. Når  $\hat{b}$  er negativ, har regresjonslinjen  $Y = \hat{a} + \hat{b} * X$  en negativ helning. I dette tilfellet er også R negativ. Både  $R = +1$  og  $R = -1$  avspeiler en perfekt lineær sammenheng. I begge tilfeller blir  $R^2$  lik  $+1$ .

Jo nærmere  $R^2$  ligger 1, desto bedre er modellens forklaringskraft. I vårt eksempel for Vestby er  $R^2$  lik 0,16. Det betyr at mye av variasjonen i innflytting henger sammen med andre faktorer enn boligbygging.

NB1: Å finne en modell med størst mulig verdi for  $R^2$  er ikke mål i seg selv i analysen. Det nytter ikke å finne to variabler X og Y som har veldig høy  $R^2$ , med mindre vi kan forklare hvorfor. F.eks. modellen  $Y = a + b * X$  har like stor  $R^2$  som  $X = c + d * Y$ !

NB2. En kan bevise at  $R^2$  har samme verdi som kvadraten av utvalgets korrelasjonskoeffisient  $r_{XY}$ :  
 $R^2 = r_{XY}^2$ .

### Generalisering

Multivariat regresjonsmodell: flere uavhengige variabler samtidig

Formel:  $Y = a + b \cdot X + c \cdot Z$

Uavhengige variabler:  $X$  og  $Z$ . Konstant  $a$ , stigningstall  $b$  og stigningstall  $c$  estimeres fra data.

$Z$  kan f.eks. være kommunens befolkningsstørrelse: jo større kommunen, desto mer innflytting.

Framgangsmåten i multivariat regresjon er den samme som før:

- 1) estimer verdiene av  $a$ ,  $b$  og  $c$ ;
- 2) sjekk t-verdiene for  $\hat{a}$ ,  $\hat{b}$  og  $\hat{c}$ ;
- 3) beregn  $R^2$ .

Jfr. PC-øvelse i uke 38.

### Anbefalt litteratur:

G. Løvås: "Statistikk for universiteter og høyskoler" kap. 7. Universitetsforlaget 2013.