


# Eksamen MED1100-3\_V19\_KONT

## Konsekvenser av den psykometriske analysen av resultatene for primærsensuren

Figuren nedenfor viser poengfordelingen (minimum, 25-prosentil, median, 75-prosentil, maximum) på de ulike digitale eksamensoppgavene etter primærsensur og korreksjoner.



Etter korreksjoner var den gjennomsnittlige totalscoren for alle spørsmål under ett 61.

Følgende spørsmål ble fjernet helt fra sensuren (*opprinnelig* fasitsvar i grønt):

Spørsmål 4.1.29 i oppgave OPPGAVE4:

*Gjærsoppen Candida er hyppigste etiologi til soppinfeksjon på hud og slimhinner (trøske). Hvilket utsagn er mest korrekt?*

- *Candida albicans er hyppig årsak til invasive soppinfeksjoner i Norge*
- *Candida trøske i munnhulen behandles med flukonazol per oralt*
- *Candida trøske i munnhulen behandles med Canesten salve*
- *Candida-celler kan enkelt påvises ved "våtpreparat"*

Gjennomsnittlig score var 14.  
Spørsmålet var feil konstruert.

Spørsmål 4.1.30 i oppgave OPPGAVE4:

*Hvilken av følgende sopp-artene er en vanlig årsak til trøske?*

- *Aspergillus*
- *Blastomyces*
- *Candida albicans*
- *Cryptococcus*

Gjennomsnittlig score var 0.  
Det var teknisk feil i spørsmålet.

Spørsmål 4.1.31 i oppgave OPPGAVE4:

*De basale smittevernrutinene (standardtiltak) for håndtering av pasienter er utarbeidet for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner. Hvilket utsagn er mest korrekt?*

- *Rutinene skal hindre smittespredning til og mellom pasienter*
- *Rutinene er ikke tilstrekkelig for å hindre smittespredning fra pasienter til helsepersonell, da benyttes de utvidede smittevernrutinene*
- *Rutinene er basert på prinsippet om at all ikke-intakt hud, slimhinner og aerosoler fra luftveiene kan inneholde smittestoffer*
- *Rutinene skal benyttes ved all pasientkontakt*

Gjennomsnittlig score var 14.  
Spørsmålet var uheldig konstruert.