

# Stasjon 10

## Informasjon til kandidaten

Du er LIS 1 i en kommune med lang vei til sykehus. En pasient med en alvorlig sårinfeksjon skal transporteres med ambulanse.

Sykehuslegen ber deg om før avreise å henge opp en infusjon med **Klindamycin 8 mg/kg, fortynnet i 100 mL NaCl 9 mg/mL**

Pasienten veier 75 kg.

## Du har tilgjengelig:

- Kalkulator
- NaCl 9 mg/mL, 100 mL
- Infusjonssett
- Klindamycin injeksjonsvæske 150 mg/mL
- Sprøyter og kanyler

## Oppgave

1. Monter infusjonssett på NaCl-posen slik at det er klart til infusjon
2. Trekk opp rett mengde klindamycin og tilsett det i NaCl-posen
3. Koble infusjonssettet til venekanylen og start infusjonen

## Stasjon 10 – Anestesi

Skåringsark

MED6800 V22

Sensor tilstede: JA  NEI 

Kandidatnummer: .....

Eksaminator: .....

	Maks poeng	Skår
Monterer infusjonssett i riktig port på NaCl-posen, og behandler både "spydet" på infusjonssettet og posens infusjonsport sterilt	2	
Fyller dråpekammeret ca. halvveis opp, ved å trykke på kammeret gjentatte ganger med «glideklemmen» lukket	2	
<b>Null poeng hvis tomt eller helt fylt kammer</b>		
Skyller gjennom infusjonssettet helt frem	4	
Behandler toppen av hetteglasset med klindamycin 150 mg/mL sterilt	1	
Trekker opp 600 mg = 4 mL klindamycin i en 5 mL sprøyte	3	
<b>Bruk av to 2 ml sprøyter gir samme poeng, forutsatt at dosen blir rett og kandidaten rekker å bli ferdig med oppgaven</b>		
Setter 4 mL klindamycin 150 mg/mL i NaCl-posens port	3	
<b>Får kun 2 poeng hvis problemer med steriliteten</b>		
Monterer infusjonssettet på riktig inngang på venekanylen, med steril teknikk	3	
Starter infusjonen ved å åpne glideklemmen	2	
<b>Null poeng hvis infusjonen startes før klindamycin er tilsatt Ett poeng hvis kandidaten trenger påminnelse for start</b>		
Legger opptrekksspissen i gul boks for risikoavfall	1	

Maks poeng: 21 poeng

Krav til bestått: 14 poeng

Total skår: .....

Evt. kommentarer: