

Stasjon 10

Informasjon til kandidaten

Du er LIS 1 i kommunal legevakt. Du tilkalles til en hjertestans.

To ambulansesarbeidere er allerede i gang med DHLR (hjerter-lunge-redning med defibrillator).

Pasienten har ventrikkelflimmer.

Du har tilgjengelig:

- Kalkulator
- Utstyr for venekanylering
- Adrenalin 1 mg/mL
- Amiodaron 50 mg/mL
- Medikament-merkelapper
- Ferdigfylte sprøyter med NaCl 9 mg/mL til skylling
- Sprøyter og kanyler

Oppgave

1. Legg en venekanyle på pasienten
2. Trekk opp **1 mg adrenalin**
3. Trekk opp **300 mg amiodaron**
4. Sett begge medikamentene i venekanylen, skyll med NaCl mellom dosene og etterpå

Stasjon 10 – Anestesi

Skåringsark

MED6800 V22

Sensor tilstede: JA NEI

Kandidatnummer:

Eksaminator:

	Maks poeng	Skår
Setter staseslange, legger kanyler, tar ut mandreng, propper kanylen, skyller igjennom med NaCl, og plastrer kanylen tilstrekkelig til at den ville siddet	3	
Trekker opp 1 mg = 1 mL adrenalin i en 2 mL sprøyte Bruk av 5 ml sprøyte gir 1 poeng, forutsatt at kandidaten samtidig presiserer at det settes 1 mL adrenalin	3	
Trekker opp 300 mg = 6 mL amiodaron i en 10 mL sprøyte	3	
Merker minst én medikamentsprøyte for å skille medikamentene fra hverandre Bruk av andre metoder til å holde sprøytene fra hverandre gir 1 poeng	3	
Setter korrekt dose adrenalin i fungerende venekanyler Null poeng hvis staseslangen fortsatt er strammet Hvis kandidaten skrur av proppen og setter medikament der, trekkes 2 poeng dersom venen ikke klemmes av ved bytte av sprøyter	3	
Setter korrekt dose amiodaron i fungerende venekanyler Null poeng hvis staseslangen fortsatt er strammet Hvis kandidaten skrur av proppen og setter medikament der, trekkes 1 poeng dersom venen ikke klemmes av ved bytte av sprøyter	3	
Skyller med NaCl i fungerende venekanyler mellom og etter alle medisindosene Null poeng hvis staseslangen fortsatt er strammet	2	
Legger alle nålespisser i gul boks for risikoavfall	1	

Maks poeng: 21 poeng

Krav til bestått: 14 poeng

Total skår:

Evt. kommentarer: